

Bodovanje SDQ-a popunjenog od strane roditelja ili nastavnika

25 točaka u SDQ-u obuhvaća 5 kategorija koje se svaka sastoje od 5 točaka.. Obično je najlakše prvo bodovati svih 5 kategorija, a zatim odrediti ukupan rezultat poteškoća. "Djelomično točno" se uvijek boduje sa 1, no bodovanje "Netočno" i "Potpuno točno", se razlikuje ovisno o točki, odnosno kako je prikazano tablicom. Za svaku od 5 kategorija rezultat se može kretati od 0 do 10, ako su svih 5 točaka ispunjene. Rezultat kategorije se može razmjerno ocijeniti ako je najmanje 3 točke ispunjeno.

Kategorija emocionalnih simptoma

	Netočno	Djelomično točno	Potpuno točno
Često se žali na glavobolje, bolove u trbuhu ili mučninu	0	1	2
Ima puno briga, često izgleda zabrinuto	0	1	2
Često je nesretno, potišteno ili plačljivo	0	1	2
Nervozno je ili nesamostalno u novim situacijama, lako gubi samopouzdanje	0	1	2
Ima puno strahova, lako se uplaši	0	1	2

Kategorija problema u ponašanju

Često ima nastupe bijesa ili razdražljivosti	0	1	2
Uglavnom poslušno, obično učini ono što odrasli traže	2	1	0
Često se tuče sa drugom djecom ili ih maltretira	0	1	2
Često laže ili vara	0	1	2
Krade kod kuće, u školi ili drugdje	0	1	2

Kategorija hiperaktivnosti

Nemirno, pretjerano aktivno, ne može dugo ostati mirno	0	1	2
Stalno se vrpolji i nemirno je	0	1	2
Lako izgubi pažnju, koncentracija mu varira	0	1	2
Razmisli prije nego nešto učini	2	1	0
Zadatke izvršava do kraja, ima dobar raspon pažnje	2	1	0

Kategorija problema u odnosima sa vršnjacima

Pretežno usamljeno, teži igranju sa samim sobom	0	1	2
Ima najmanje jednog dobrog prijatelja	2	1	0
Druga djeca ga uglavnom vole	2	1	0
Druga djeca ga zadirkuju ili maltretiraju	0	1	2
Bolje se slaže sa odraslima nego sa drugom djecom	0	1	2

Kategorija odnosa prema društvu

Ima obzira prema osjećajima drugih	0	1	2
Spremno dijeli sa drugom djecom (slatkiše, igračke, olovke, itd.)	0	1	2
Pomoći će ako je netko povrijeđen, uznemiren ili se osjeća bolesno	0	1	2
Ljubazno je prema mlađoj djeci	0	1	2
Često dobrovoljno pomaže drugima (roditeljima, nastavnicima, drugoj djeci)	0	1	2

Ukupan rezultat poteškoća:

Dobiva se na način da se zbroje rezultati svih kategorija osim kategorije odnosa prema društvu. Dobiveni rezultat se može kretati od 0 do 40 (i smatra se nepostojanim ako nema rezultata jedne od kategorija).

Tumačenje rezultata simptoma i definiranje “slučajeva” iz rezultata simptoma

Iako se rezultati SDQ-a često mogu koristiti kao neprekidne varijable, ponekad je praktično klasificirati rezultate kao normalne, granične i abnormalne. Uz pomoć raspona prikazanih u donjoj tablici, abnormalan rezultat u jednoj kategoriji ili ukupnom rezultatu poteškoća može se koristiti za identifikaciju vjerovatnih “slučajeva” sa mentalnim tegobama. Očito je da je ovo gruba i gotova metoda za uočavanje oboljenja – kada bi kombinirali informacije iz SDQ-a i rezultate dodatka o utjecajima simptoma od više osoba, rezultat bi bio bolji, ali još uvijek daleko od savršenog. Po prilici 10% rezultata društvenog uzorka abnormalnog opsega na bilo koji rezultat, sa dodatnih 10% rezultata u graničnom opsegu. Točne proporcije variraju, ovisno o zemlji, godinama i spolu – normativni podaci SDQ-a su dostupni preko internet stranica. Ako želite prolagoditi raspone i kriterije koji definiraju slučaj za te karakteristike, od velike je važnosti povećati granicu da bi ste izbjegli lažne pozitivne nalaze. Također, još je važnije spustiti prag, kad želite izbjeći lažne negativne nalaze.

<u>SDQ ispunjen od strane roditelja</u>	Normalan	Graničan	Abnormalan
Ukupan rezultat poteškoća	0-13	14-16	17-40
Rezultat kategorije emocionalnih simptoma	0-3	4	5-10
Rezultat kategorije problema u ponašanju	0-2	3	4-10
Rezultat kategorije hiperaktivnosti	0-5	6	7-10
Rezultat kategorije problema u odnosima sa vršnjacima	0-2	3	4-10
Rezultat kategorije odnosa prema društvu	6-10	5	0-4

<u>SDQ ispunjen od strane nastavnika</u>	Normalan	Graničan	Abnormalan
Ukupan rezultat poteškoća	0-11	12-15	16-40
Rezultat kategorije emocionalnih simptoma	0-4	5	6-10
Rezultat kategorije problema u ponašanju	0-2	3	4-10
Rezultat kategorije hiperaktivnosti	0-5	6	7-10
Rezultat kategorije problema u odnosima sa vršnjacima	0-3	4	5-10
Rezultat kategorije odnosa prema društvu	6-10	5	0-4

Stvaranje i Tumačenje Rezultata o Utjecaju Simptoma

Kada koristimo SDQ koji sadrži “Dodatak o Utjecaju Simptoma”, točke koje se odnose na sveukupne i socijalne poteškoće mogu biti zbrojene da stvore rezultat o utjecaju simptoma koji se kreće od 0-10 za verziju popunjenu od strane roditelja i od 0-6 za verziju popunjenu od strane nastavnika.

<u>Roditeljski izvještaj</u>	Uopće ne	Samo malo	Poprilično	Jako utječu
Poteškoće uznemiruju ili zamaraju dijete	0	0	1	2
Utječu na ŽIVOT KOD KUĆE	0	0	1	2
Utječu na PRIJATELJSTVO	0	0	1	2
Utječu na ŠKOLSKO UČENJE	0	0	1	2
Utječu na OPUŠTAJUĆE AKTIVNOSTI	0	0	1	2

Nastavnički izvještaj

Poteškoće uznemiruju ili zamaraju dijete	0	0	1	2
Utječu na ODNOS SA VRŠNJACIMA	0	0	1	2
Utječu na ŠKOLSKO UČENJE	0	0	1	2

Odgovori na pitanja o kronicitetu poremećaja i teretu koji predstavlja drugima nisu uključeni u rezultat o utjecaju simptoma. Kada je odgovor “Ne” na prvo pitanje u ‘Dodatku o Utjecaju Simptoma’ (npr. kada ne misle da dijete ima emocionalne probleme ili probleme u ponašanju), više ih se ne traži da završe pitanja o poremećaju i poteškoćama; utjecajni rezultat se u ovim okolnostima smatra nulom.

Iako se rezultati o utjecaju simptoma mogu koristiti kao neprekidne varijable, ponekad je praktično klasificirati rezultate kao normalne, granične i abnormalne; ako je ukupni rezultat o utjecaju simptoma 2 ili više onda je abnormalan; rezultat od 1 je graničan; i rezultat 0 je normalan